

Tapning af væske i bughulen (ascites)

Til patienter og pårørende

Som regel kan væske i bughulen behandles med vanddrivende medicin, men i nogle tilfælde kan det blive nødvendigt at tappe væsken ud ved hjælp af et dræn. Det foregår i vores ambulatorium eller på sengeafdelingen.

Forud for tapningen skal du have taget blodprøver. Blodprøverne må ikke være mere end 3 dage gamle. I forbindelse med tapningen vil du få din mave ultralydsscannet. Herefter vil du blive lokalbedøvet på det sted, hvor drænet skal være. Bedøvelsen kan gøre lidt ondt og spænde i huden, men det aftager efter få minutter.

Lægen anlægger drænet gennem et lille hul i maveskindet. En slange sættes på drænet, så væsken kan løbe ned i en pose. Noget af væsken vil blive sendt til undersøgelse for at se, om det indeholder bakterier.

Drænet bliver i maven indtil alt væsken er fjernet fra bughulen. Ofte kan du tage hjem om eftermiddagen samme dag, men drænet kan ligge op til 24 timer. Du kan frit gå rundt, når drænet er lagt.

Der er en ganske lille risiko for, at der kan opstå blødning fra indstiksstedet eller stikkes hul på tarmen.

Væsken fra bughulen indeholder mange proteiner. Ved tapningen er det nødvendigt at erstatte proteintabet. Det gøres ved at anlægge en adgang i blodåren og give proteiner i et drop.