

PT-skanning fluorid)

Til patienter og pårørende

Indtast introtekst

Til patienter og pårørende

Formål

Formålet er at undersøge for forandringer i skelettet.

Forberedelse til undersøgelsen

Vi anbefaler, at du kun indtager et let morgenmåltid/frokost

Undgå venligst at bære smykker på undersøgelsesdagen.

Blodprøver

Da du skal have kontrast, har vi brug for en frisk blodprøve, som måler dine nyrsers funktion. Hvis du har normal nyrefunktion, skal blodprøven være taget inden for 3 måneder før undersøgelsen. Har du nedsat nyrefunktion skal blodprøven tages tidligst 8 dage inden og senest 1 dag før undersøgelsen. Du skal derfor få taget en blodprøve enten ved egen læge eller nærmeste sygehus.

Medicin:

Al fast daglig medicin og især smertestillende må du gerne tage.

Undersøgelsen

Du får en indsprøjtning med et radioaktivt sporstof i armen. Herefter hviler du i ca. 30 minutter inden billedoptagelsen. Du skal ligge helt stille under billedoptagelsen (ca. 20 minutter).

Varighed: Hele undersøgelsen varer ca. 1½ - 2 timer.

Gravide og ammende skal inden undersøgelsen henvende sig til Nuklearmedicinsk Afdeling på tlf. 79 18 24 65 .