

Jernbehandling via drop - behandling med Monoferinfusion

Til patienter og pårørende

Hvornår anvendes Monofer?

Jern gives som drop ved jernmangel, når jerntabletter ikke optages tilstrækkelig i tarmen.

Behandling

Monofer er en mørkebrun ugenomsigtig vandig opløsning, der blandes i saltvand. Du får anlagt drop i en blodåre i hånden, hvorigennem monofer behandlingen gives.

Ved første behandling gives der en såkaldt testdosis.

Det vil sige, en lille dosis langsomt, for at sikre, at der ikke er bivirkninger.

Herefter gives resten af behandlingen.

Behandlingen varer ca. 1-1½ time.

Efter behandlingen skal du blive i venterummet i 30 min.

Ved evt. efterfølgende behandlinger gives behandlingen over ca. 45 min.

Medbring gerne læsestof, musik eller lignende.

Bivirkninger

Generelt tåles monofer godt.

Der kan forekomme metalsmag samt gener fra, hvor droppet har været lagt.

Sjældne kan forekomme

Feber, kvalme, opkastninger, mavesmerter, diarre, åndenød, hjertebanken, muskelsmerter og muskelkramper.

Yderst sjældent

Føleforstyrrelser og allergisk reaktion.

Jerntabletter

Får du jerntabletter, skal du holde pause med dem under behandlingen.

Hvis du skal genoptage tabletbehandlingen, får du besked fra din kontaktlæge.