

Kytril findes som tabletter á hhv. 1 mg og 2 mg.

## Hvordan virker medicinen?

Kytril har en kvalmeforebyggende og kvalmestillende virkning. Virkningen er størst efter ca. 1-2 timer.

## Dosering

2 mg. 1 gang i døgnet på dage hvor der gives kemoterapi og 1 mg. 2 gange i døgnet mod forsinket kvalme og opkastning.

Den første dosis tages +/- to timer før behandlingen.

## Hvordan indtages medicinen?

Tabletterne indtages med rigelig væske.

## Hvad er de mest almindelige bivirkninger ved medicinen?

Der kan forekomme hovedpine og forstoppelse. I sjældne tilfælde kan der forekomme hud udslæt.

- Hovedpine: Hvis du får hovedpine, kan du tage et par almindelige hovedpinetabletter. Hvis hovedpinen er meget slem, kan du ved senere kemoterapi eventuelt tage noget andet kvalmestillende medicin.
- Forstoppelse: Hvis du ikke har afføring som vanligt, skal du højst vente 1-2 dage, før du tager medicin for det. Normalt kan det ved forstoppelse hjælpe at spise svesker, drikke rigeligt vand og få motion, men i dette tilfælde vil det ofte ikke være nok.

Vi anbefaler dråber Actilax, der kan købes i håndkøb. Hvor mange dråber man skal tage, er meget individuelt, men start eventuelt med 5-10 dråber.

Hvis du på trods af behandling med Kytril har kvalme, så tal med en sygeplejerske eller læge om det, da der ofte vil være mulighed for at ændre i den kvalmestillende behandling.