

# Pacemaker-skift

Til patienter og pårørende

## Hjertesygdomme

Pacemakeren skal skiftes efter en årrække, fordi batteri kapaciteten efterhånden bliver opbrugt. Når du er til kontrol i Pacemakerklinikken, bliver batteriets levetid kontrolleret og når batteriet er ved at være opbrugt, planlægges skift af pacemakeren.

Batteriet er en integreret del af pacemakeren og derfor skiftes hele pacemakeren og ikke kun batteriet. Elektroderne bliver kontrolleret og udskiftes kun ved behov.

## Forberedelse

- Du skal have taget blodprøver og elektrokardiogram 4-7 dage før operationen. Får du tbl. Marevan eller Marcoumar, skal du holde pause med det 3 dage før operationen.
- Får du tbl. Pradaxa, Xarelto, Lixiana eller Eliquis, skal du holde pause 1 dag før operationen.
- Øvrigt blodfortyndende skal ikke pauseres.
- Din øvrige medicin må du tage som vanlig. Får du vanddrivende medicin vil det være en fordel at tage dette efter operationen.
- Er du hjerteklap opereret og får blodfortyndende herfor, bedes du kontakte pacemaker ambulatoriet.
- Du skal ikke faste til operationen.
- Du skal inden fremmøde (enten samme dag eller aftenen før operationen) have været i bad
- Medbring gerne læsestof, da der kan forekomme ventetid.
- Du må ikke køre bil 7 dage efter operationen.

## På operationsdagen

- Du får målt dit blodtryk, puls, temperatur, højde og vægt.
- Du får udleveret hospitalstøj.
- Evt. hår på brystet fjernes
- Du får anlagt et lille plastikrør (drop) i din arm til indgivelse af medicin og antibiotika.

# Pacemaker-skift

- Du får udleveret smertestillende medicin og lidt at slappe af på.

## Operationen

Selve operationen foregår på vores røntgen afdeling. Der vil være 1 læge og 2 sygeplejersker til stede. Operationen foregår i lokalbedøvelse. Det indebærer, at du er vågen og vil kunne tale med sygeplejerskerne og lægen under operationen.

Inden den egentlige operation starter, går der ca 1/2 time med forskellige forberedelser. Huden desinficeres over pacemakern og du bliver dækket af med sterile klæder.

Herefter anlægges lokalbedøvelsen omkring pacemakern. Lokal bedøvelsen kan oftest mærkes som en kortvarig spænding eller svien i huden. Når lokalbedøvelsen virker, lægger der et snit i huden. Herfra kan lægen tage pacemakern ud og indsætte den nye pacemaker.

Oplever du smerter eller ubehag under operationen, er det vigtigt du fortæller det, så vi kan hjælpe dig ved at give yderligere smertestillende eller beroligende i dropet.

## Efter operationen

Du kommer tilbage til hjerte ambulatoriet, hvor du får lidt at spise og drikke. Din nye pacemaker bliver kontrolleret og finjusteret.

Du bliver udskrevet efter ca. 4 timer.

## Komplikationer

Kun i sjældne tilfælde opstår der komplikationer.

Der kan opstå en blodansamling på operationsstedet. Dette kan give hævelse og ømhed, der oftest forsvinder af sig selv.

Elektroden kan blive beskadiget under operationen. Dette vil i så fald kræve, at du får opereret en ny elektrode ind enten med det samme eller ved en ny operation.

Trods den forebyggende behandling mod betændelse, ses denne komplikation i sjældne tilfælde.

## Kontrol af din pacemaker

Du vil blive indkaldt som vanligt til kontrol af din pacemaker.