

Prednisolon

Til patienter og pårørende

Medicinvejledning

Du kan i denne pjece læse om den medicin, som du har fået recept på. Du kan læse om virkning og bivirkninger samt, hvordan du tager medicinen.

Virkning

Prednisolon hæmmer sygdomsaktiviteten.

Stimulerer appetitten. Pas derfor på med ikke at spise mere, end du plejer.

Kan øge dit velbefindende og virke opkvikkende, og det kan være svært at sove i en periode.

Bivirkninger

Du kan opleve bivirkninger ved medicinen. De mest almindelige bivirkninger er nævnt i det følgende.

Kortvarig rødme af ansigt, hals og bryst

Søvnløshed

Halsbrand

Da Prednisolon kan forårsage søvnløshed, anbefaler vi, at du tager Prednisolon om morgenen. Tal med os, hvis du oplever søvnløshed.

Hvis du får halsbrand, kan det ofte hjælpe at drikke mælk.

Ved behandling i mere end 1 uge og især ved store doser

Kan der i nogle tilfælde optræde vægtstigning (se virkning), måneansigt og tynd/skør hud.

Kan din psykiske tilstand påvirkes i form af opstemthed/depression.

Kontakt

Er du og dine pårørende i tvivl om noget/har spørgsmål, er I altid meget velkomne til at kontakte os.

CPRS Center Syd

Åbningstid: mandag til fredag kl. 8.00-15.00

Sekretær: 7918 2275 telefontid: 8-11 & 13-14