

Blæreskylning med Mitomycin

Til patienter og pårørende

Information om blæreskylning med Mitomycin

Mitomycin tilhører gruppen af lægemidler der kaldes cytostatika (cellehæmmende midler) og anvendes ved behandling af blærepolyper/tumorer i blæren.

Procedure

Efter afvaskning indføres et tyndt plastik-kateter i blæren, og indholdet af urin udtømmes. Gennem kateteret indsprøjtes nu en lille mængde (40 ml.) væske, der indeholder Mitomycin. Væsken er mørkfarvet. Kateteret fjernes, og opløsningen efterlades i blæren, hvor den bør forblive længst muligt dog højst i 2 timer. For at gøre dette muligt bør du mindske væskeindtaget 4 timer før behandlingen og 2 timer efter behandlingen.

Du skal altså holde på vandet, hvis du kan, og derefter blot kvittere opløsningen sammen med næste urinportion ved en helt normal vandladning 2 timer senere.

Ved første vandladning efter hver behandling skal du være ekstra opmærksom på din hygiejne og vaske hænderne og underlivet omhyggeligt for at undgå allergisk udslet.

Medmindre du følger et program med begrænset væskeindtagelse rådes du til at drikke rigeligt det første døgn efter behandlingen.

Virkning

Mitomycin skader tumorcellerne ved at hæmme delingen (væksten) af cellerne.

Livstil

Både kvinder og mænd skal bruge effektiv prævention eller være seksuelt afholdende under behandlingen, og i 6 mdr. efter behandlingens ophør, pga. risiko for fosterskader.

Evt. bivirkninger

- Svie og smerte ved vandladning.
- Hyppig vandladninger.
- Blod i urinen.
- Allergisk udslet.
- Kløe på hænder og underliv.