

Fibrindannelser i bughulen APD Bica-Vera Poser Fresenius

Til patienter og pårørende

Hvad er fibrindannelse i bughulen?

Under dialysen udskilles små proteiner. Når de klitrer sig sammen kaldes det fibrin. Fibrinerne kan stoppe de små huller i P-dialysekateteret ved ind og udløb.

Hvordan behandles fibrindannelse i bughulen?

Fibrindannelse i bughulen opløses ved at tilsætte Fragmin til 1 dialysepose på 3000ml. Så der igen bliver frit ind og udløb af dialysevæske.

Sådan gør du:

- Udfør hånddesinfektion med klorhexidin håndsprit
- Der skal bruges:
 - 1 Bica-Vera pose 3000ml med den glucose koncentration du plejer at bruge.
 - Blå klemmer til de andre poser
 - 1 sprøjte med Fragmin 2500IE
- Dialyseposen pakkes ud
- Åbn for Fragmin sprøjten
- Udfør hånddesinfektion med klorhexidin håndsprit
- Tag hættten af sprøjten og stik igennem membranen på medicinporten (blå)
- Tryk stemplet i bund
- Vend posen et par gange
- Sæt en blå klemme på de andre poser, når 1 indløb er foretaget fjernes klemmerne igen.

Posen med Fragmin skal anvendes indenfor 24 timer. Der må kun anvendes 1 pose i døgnet med Fragmin.