

Fibrindannelser i bughulen CAPD poser

Til patienter og pårørende

Hvad er fibrindannelse i bughulen?

Under dialysen udskilles små proteiner. Når de klister sig sammen kaldes det fibrin. Fibrinerne kan stoppe de små huller i P-dialysekateteret ved ind og udløb.

Hvordan behandles fibrindannelse i bughulen?

Fibrindannelse i bughulen opløses ved at tilsætte Fragmin til dialyseposen, der skal ligge på varmpladen. Så der igen bliver frit ind og udløb af dialysevæske.

Sådan gør du:

- Udfør hånddesinfektion med klorhexidin håndsprit

Der skal bruges:

- 1 Physioneal pose 2000/2500ml med den glucose koncentration du plejer at bruge .
- 1 spritswap-kun Baxter
- 1 sprøjte med Fragmin 2500IE

- Dialyseposen pakkes ud.
- Åbn for Fragmin sprøjten
- Udfør hånddesinfektion med klorhexidin håndsprit
- Sprit medicinporten af med sprit swappen-kun Baxter
- Tag hættten af sprøjten og stik igennem membranen på medicinporten
- Tryk stemplet i bund
- Vend posen et par gange.

Posen skal anvendes indenfor 24 timer. Der må kun anvendes 1 pose i døgnet med Fragmin.